

广东省药学会文件

粤药会〔2025〕13号

关于发布《冠状动脉旁路移植术围术期药学监护专家共识》的通知

各医疗机构：

冠状动脉旁路移植术（Coronary artery bypass grafting, CABG）是治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病的主要方法之一。其主要目的是通过建立旁路血管，绕过狭窄或阻塞的冠状动脉，从而改善心肌的血液供应。CABG手术的历史悠久，涉及多个复杂步骤，包括开胸、心肺转流、心脏停搏、血管吻合等，手术过程中需要使用心肺机建立心肺旁路，使心脏停搏并排空血液，以便于血管吻合。尽管有心脏保护措施，但心脏停搏仍可能带来并发症，如心肌功能失常、心律失常和心排量降低等。因此，CABG患者围手术期的感染、血栓、疼痛、营养、血压、血糖、液体、恶心呕吐、气道等多方面都涉及药物治疗，会产生药物治疗相关问题。

目前，药师在围手术期药物治疗管理中已经发挥出越来越重要的作用，然而针对CABG患者开展围术期药学监护尚无统一工作指引。因此，本会组织编写了《冠状动脉旁路移植术围术期药学监护专家共识》，旨在规范患者术前用药评估，围手术期药学监护，术后随访和用药教育，提高手术安全性和有效性，降低术后并发症的发生率，最终提高患者生活质量以及缩短住院时间，促进患者术后康复和长期预后。

为尊重知识产权，引用本共识内容撰写公开出版物，如论文、

专著等，以及制作计算机系统、APP等，请注明出处。本共识引用格式为：[1]广东省药学会. 冠状动脉旁路移植术围术期药学监护专家共识 [J/OL]. 今日药学, 1-24[2025-01-03]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20250102.1004.002.html>.

现予以发布，供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路753号东塔701房 广东省药学会510080

联系电话：（020）37886326, 37886321 传 真：
37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网 址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

1、《冠状动脉旁路移植术围术期药学监护专家共识》起草专家组

2、《冠状动脉旁路移植术围术期药学监护专家共识》（请在本会网站“下载专区”下载）



附件 1

《冠状动脉旁路移植术围术期药学监护专家共识》起草专家组

执笔领导小组：

郑志华	广东省药学会	副理事长兼秘书长、 主任药师
陈吉生	广东药科大学附属第一医院	主任药师
陈孝	中山大学附属第一医院	主任药师
刘东	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主任药师
刘韶	中南大学湘雅医院	主任药师
刘韬	中山大学肿瘤防治中心	主任药师
张晓慎	暨南大学附属第一医院	主任医师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师

执笔：

魏安华	华中科技大学同济医学院附属同济医院	副主任药师
王璐	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主管药师
曾露	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主管药师
刘金玉	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主管药师

医药专家（以姓氏拼音为序）：

方静	华中科技大学同济医学院附属同济医院	副主任医师
郭洁茹	华中科技大学同济医学院附属同济医院	副主任药师
贡雪芄	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主任药师
黄妍	江汉大学附属医院武汉市第六医院	副主任药师
黄珈雯	暨南大学附属第一医院	副主任药师
贾莉	新疆维吾尔自治区人民医院	副主任药师

李娟	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主任药师
梁嘉碧	中山大学附属第五医院	副主任药师
赖莎	广东药科大学附属第一医院	副主任药师
唐密密	中南大学湘雅医院	副主任药师
王捷	新疆医科大学第一附属医院	主任药师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师
吴玥	武汉大学人民医院	副主任药师
吴禹蒙	哈尔滨医科大学附属第四医院	副主任药师
徐西振	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主任医师
许世伟	哈尔滨医科大学附属第二医院	副主任药师
萧伟斌	中国人民解放军南部战区总医院	副主任药师

秘书（以姓氏拼音为序）：

罗攀	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主管药师
李伟杰	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主管药师
李梦	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主管药师

致谢：

谢又佳	中国人民解放军南部战区总医院	主管药师
-----	----------------	------